



“En atención primaria de salud: ciencia para todos”

Comportamiento de la salud bucal en adolescentes fumadores del Instituto Politécnico de Informática

Autores.

Dra. Ileana María Yero Mier¹

Dra. Marisel García Rodríguez²

Dra. Ivis Eliany Gómez Hernández³

1. Doctor en Estomatología/Especialista en Estomatología General Integral/Segundo grado/ Profesor auxiliar/ Máster en Urgencias Estomatológicas/ Clínica Estomatológica Docente Provincial “Dr. Justo Ortelio Pestana Lorenzo” de Sancti Spíritus. Sancti Spíritus, Cuba. Correo electrónico: ileanayero@infomed.sld.cu. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6940-5346>.

2. Doctor en Estomatología/Especialista en Estomatología General Integral/Segundo grado/ Profesor auxiliar/ Máster en Urgencias Estomatológicas/ Universidad de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus, Facultad de Ciencias Médicas “Dr. Faustino Pérez Hernández”, Departamento de Estomatología. Sancti Spíritus, Cuba. Correo electrónico: maricelg@infomed.cu. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4321-0254>.

3. Doctor en Estomatología/Especialista en Estomatología General Integral/Primer grado/ Profesor instructor/ Clínica Estomatológica Docente Provincial “Dr. Justo Ortelio Pestana Lorenzo” de Sancti Spíritus. Sancti Spíritus, Cuba. Correo electrónico: gomezhdzeviseliany@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3162-2561>.

RESUMEN

Introducción: el tabaquismo aumenta a la par del desarrollo de la sociedad actual, sobre todo en la adolescencia; esta práctica está asociada a una gran variedad de cambios perjudiciales en la cavidad bucal. **Objetivo:** describir la salud bucal de los adolescentes fumadores del Instituto Politécnico de informática Armando de la Rosa. **Materiales y métodos:** se realizó un estudio observacional descriptivo transversal en el período comprendido de septiembre de 2022 a octubre del 2023. Se utilizaron métodos teóricos, empíricos y

estadísticos matemáticos. Las variables empleadas fueron: edad, sexo, tiempo de adicción tabáquica, enfermedades bucales según el tiempo de adicción tabaquica, percepción del riesgo sobre tabaquismo y conocimientos sobre el tabaquismo y la cavidad bucal. **Resultados:** predominó el sexo femenino (58,5 %), el grupo de 17 a 18 años (58,5 %) y el tiempo de adicción de más de un años (46,3 %). La enfermedad periodontal afecto el 92,7 % de los adolescentes. Los conocimientos sobre el efecto del tabaquismo en la cavidad bucal fueron insuficientes en el 75,6 %, la percepción de riesgo sobre el tabaquismo fue inadecuada en el 61,0 %. **Conclusiones:** predominó el sexo femenino y el grupo de 17-18 años; así como los adolescentes fumadores de más de un años, predominando la enfermedad periodontal y caries dentales. Prevalcieron los conocimientos insuficientes sobre el tabaquismo en la cavidad bucal y la percepción del riesgo sobre el tabaquismo inadecuada. **Palabras Clave:** adolescente, tabaquismo, salud bucal, nivel de conocimientos.